

Het gebruik van fluorescentielicht in de praktijk

Indicaties en behandelingsduur



Onderstaand vindt u de gemiddelde behandelingsduur wanneer fluorescentielicht aan de standaardtherapie wordt toegevoegd. De duur van de behandeling en het aantal behandelingen moeten aangepast worden aan de ernst en de chroniciteit van de huidaandoening.

Fluorescentielicht kan op zichzelf ingezet worden of in combinatie met: shampoos, antibiotica (topicaal, oraal en injecteerbaar), anti-inflammatoire, immunosuppressieve, immunomodulerende medicatie (bv. Oclacitinib, steroïden, cyclosporine, Tacrolimus, Lokivetmab), verbandmateriaal (honingverbanden), ...

Het adequaat aanpakken van de primaire onderliggende aandoening is essentieel voor een succesvolle behandeling.

Behandelingsfrequentie: 1x per week (2 opeenvolgende behandelingen)

Oppervlakkige pyodermie

Behandelingsduur 2 - 3 weken

Indien gegeneraliseerd, kunt u er voor kiezen om de meest ernstige gebieden te behandelen met fluorescentielicht.



Foto: Dr Marchegiani

Diepe pyodermie

Behandelingsduur 4 - 6 weken

Indien gegeneraliseerd, kunt u er voor kiezen om de meest ernstige gebieden te behandelen met fluorescentielicht.



Foto: Dr Pin

Bacteriële pododermatitis en furunculose

Behandelingsduur 4 - 6 weken

Indien letsels zich zowel dorsaal als palmar / plantair bevinden, is het aangeraden om beide zijden apart te belichten.



Foto: Dr Fantini

Pyotraumatische dermatitis (hotspot)

Behandelingsduur 1 - 2 weken

Indien letsels zich nabij het aangezicht bevinden, denk er dan aan om de ogen van het dier af te dekken.



Foto: Dr Cochet-Faivre

Behandelingsfrequentie: 1x per week (2 opeenvolgende behandelingen)

Likgranuloom

Behandelingsduur 4 – 6 weken



Callus pyodermie

Behandelingsduur 4 – 6 weken



Anale furunculose en perianale fistels

Behandelingsduur 4 – 8 weken



Huidplooidermatitis

Behandelingsduur 2 – 4 weken

Indien letsels zich nabij het aangezicht bevinden, denk er dan aan om de ogen van het dier af te dekken.



Traumatische wondes (acuut en chronisch)

Behandelingsduur 4 – 6 weken

Een goede reiniging en debridement van de wonde is essentieel. Het te behandelen gebied mag een ruime marge gezond weefsel bevatten. Behandeling met fluorescentielicht kan meteen na debridement.



Chirurgische incisies

Behandelingsduur 1 – 2 weken

Het te behandelen gebied mag een ruime marge gezond weefsel bevatten. Behandeling met fluorescentielicht kan meteen na chirurgie.



Bovenstaande foto's en aanbevelingen zijn gebaseerd op case studies van specialisten. Iedere behandeling is afhankelijk van de risico-baten analyse. Vetoquinol is niet verantwoordelijk voor afwijkingen op deze protocols.